

University of Groningen

## Haemophilus "influenzae" (Pfeiffer) als ubiquitaire verwekker van acute en chronische etterige bronchitis

Mulder, Jacob

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1937

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Mulder, J. (1937). *Haemophilus "influenzae" (Pfeiffer) als ubiquitaire verwekker van acute en chronische etterige bronchitis*. [S.n.].

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN.

### I

Elke theorie over de pathogenese van de lobaire en broncho-pneumonie moet noodzakelijk rekening houden met de type-verdeeling der pneumococcen en de algemeene beteekenis van de Haemophilus influenzae als bronchitisverwekker.

### II

De bronchiëctasieën, optredende onmiddellijk in aansluiting aan corpora aliena in de bronchus, zijn een bewijs voor de opvatting, dat een bronchiëctase ontstaan kan, uitsluitend ten gevolge van endo-bronchitis.

### III

De formule van O. FRANK betreffende de gevoeligheid van het manchets-manometer systeem bij het registreeren van den pols uit de bloeddrukmanchet:

$$y^r = \frac{1}{\frac{E_M E_w}{E_B} + E_M + E_w}$$

is onvolledig (O. FRANK. Haemodynamik 1911 (bladz. 234)).

### IV

De sinusknop in het hart is als een buffersysteem geschakeld tusschen de extra-cardiale vegetatieve impulsen en de heterotopie „tachycardie”-centra.

### V

De Sumatraansche leptospira-infecties zijn niet veroorzaakt door zoetwater-leptospira (BAERMANN en ZUELZER), doch waarschijnlijk zijn o.a. de huisrat en mogelijk ook de reconvallescente patient het virusreservoir.

### VI

Bij pneumococcenperitonitis en -meningitis diene men zoo spoedig mogelijk type-specifiek anti-serum toe.

### VII

Bij meningitis „serosa” denke men aan de leptospirose van Weil en aan het bestaan van een „ménagementite bénigne des porchers”.

## VIII

Het standpunt, dat een versche accidenteele wond nooit gesondeerd mag worden, is onjuist.

## IX

Het z.g. beschermen of steunen van het perineum tijdens de partus heeft in de groote meerderheid der gevallen geen nuttig effect.

## X

De conjunctivitis van KOCH WEEKS is veroorzaakt door een haemoglobinophiele bacterie, die niet identiek is aan die van PFEIFFER.

## XI

Bij het onderwijs in de geneeskunde voere men filosofie en psycho-analyse als leervakken in.

## XII

Het academische medische onderwijs moet er ook op gericht zijn den a.s. huisarts vraagstellingen mede te geven, die slechts hun oplossing kunnen vinden, door waarnemingen in de algemeene practijk.