

University of Groningen

## Radiculopathy and radiating low back pain in general practice

Spijker-Huiges, Antje

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

2015

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Spijker-Huiges, A. (2015). *Radiculopathy and radiating low back pain in general practice*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

## **Radiculopathy and radiating low back pain in general practice**

**Antje Spijker-Huiges**

1. De prevalentie- en incidentiecijfers van het lumbosacraal radiculair syndroom in Nederland zijn feitelijk onbekend. (dit proefschrift)
2. Uitstralende lage rugpijn mét radiculopathie lijkt gepaard te gaan met meer zorgconsumptie dan uitstralende lage rugpijn zónder radiculopathie. (dit proefschrift)
3. Epidurale corticosteroïdinjecties geven in de eerstelijns populatie weinig méér pijnverlichting dan de gebruikelijke behandeling bij acuut lumbosacraal radiculair syndroom. (dit proefschrift)
4. Productieverlies door ziekteverzuim vormt het grootste deel van de maatschappelijke kosten van het lumbosacraal radiculair syndroom. (dit proefschrift)
5. Toevoegen van epidurale corticosteroïdinjecties aan de gebruikelijke behandeling verlaagt de ziektekosten van het lumbosacraal radiculair syndroom. (dit proefschrift)
6. De SF-6D is bij patiënten met acuut lumbosacraal radiculair syndroom niet responsief genoeg om een klinisch relevant verschil in gezondheidstoestand te detecteren. (dit proefschrift)
7. De huisarts moet zich, bij streven naar kwaliteitsverbetering van de zorg aan pijnpatiënten, richten op continuïteit en samenwerking. (Nivel 2013; 'Ervaringen met pijnbehandeling [...] van chronische pijnpatiënten')
8. Bij het voorschrijven van protonpompremmers aan patiënten met functionele dyspepsie geldt 'bezint eer ge begint'. (A. Spijker-Huiges, *Eur J Gen Pract.* 2006;12:10-4).
9. Het achterwege laten van speculumonderzoek bij vrouwen met herkende klachten van candidavaginitis is niet nalatig maar patiëntvriendelijk. (A. Spijker-Huiges in *Opzij*, 2007, ingezonden)
10. Een synchroon circadiaan ritme is 'op één kussen' van groter belang dan een gelijk geloof.

## Radiculopathy and radiating low back pain in general practice

Antje Spijker-Huiges

1. De prevalentie- en incidentiecijfers van het lumbosacraal radiculair syndroom in Nederland zijn feitelijk onbekend. (dit proefschrift)
2. Uitstralende lage rugpijn mét radiculopathie lijkt gepaard te gaan met meer zorgconsumptie dan uitstralende lage rugpijn zónder radiculopathie. (dit proefschrift)
3. Epidurale corticosteroïdinjecties geven in de eerstelijns populatie weinig méér pijnverlichting dan de gebruikelijke behandeling bij acuut lumbosacraal radiculair syndroom. (dit proefschrift)
4. Productieverlies door ziekteverzuim vormt het grootste deel van de maatschappelijke kosten van het lumbosacraal radiculair syndroom. (dit proefschrift)
5. Toevoegen van epidurale corticosteroïdinjecties aan de gebruikelijke behandeling verlaagt de ziektekosten van het lumbosacraal radiculair syndroom. (dit proefschrift)
6. De SF-6D is bij patiënten met acuut lumbosacraal radiculair syndroom niet responsief genoeg om een klinisch relevant verschil in gezondheidstoestand te detecteren. (dit proefschrift)
7. De huisarts moet zich, bij streven naar kwaliteitsverbetering van de zorg aan pijnpatiënten, richten op continuïteit en samenwerking. (Nivel 2013; 'Ervaringen met pijnbehandeling [...] van chronische pijnpatiënten')
8. Bij het voorschrijven van protonpompremmers aan patiënten met functionele dyspepsie geldt 'bezint eer ge begint'. (A. Spijker-Huiges, *Eur J Gen Pract.* 2006;12:10-4).
9. Het achterwege laten van speculumonderzoek bij vrouwen met herkende klachten van candidavaginitis is niet nalatig maar patiëntvriendelijk. (A. Spijker-Huiges in *Opzij*, 2007, ingezonden)
10. Een synchroon circadiaan ritme is 'op één kussen' van groter belang dan een gelijk geloof.

