

University of Groningen

Over ulcus noma

Von Eichstorff Talma, Duco Anton

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1859

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Von Eichstorff Talma, D. A. (1859). *Over ulcus noma*. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

Eene miasmatische en contagieuse verbreiding der Noma is nog niet bewezen.

II.

De differentiële diagnose tusschen de haemorrhagiën

STELLINGEN.

van de luchtwegen en van het spijsverteringskanaal is dikwijls zeer moeilijk.

III.

De prognose bij haemorrhagia intestinalis is bijna altijd ongunstig.

IV.

Bij de behandeling van iedere hydrops, is steeds twee aanwijzingen te voldoen. 1°. De oorzaak weg te nemen. 2°. De absorptie en evacuatie van het vocht te bevorderen.

V.

Het is nog onbekend, hoe de mucilaginoso bij gonorrhoea werken.

VI.

Kwikkereidingen zijn bij Phthisis nadeelig.

STELLINGEN.

VII.

Het zoogenaamde nonnengeruisch laat zich uit den bouw der venae jugulares verklaren.

VIII.

De baarmoedersonde is als diagnostisch middel, om de verschillende gezwellen in den uterus van elkander te onderscheiden, van weinig waarde.

IX.

Glycerine is het beste middel, om het nablijven van pokdellen in het aangezicht enz. te voorkomen.

X.

Salmiak is bij gebrekkige expectoratie in pneumonie zeer aan te bevelen.

XI.

Asthma is cene zuivere neurose.

STELLINGEN.

XII.

Bij Tuberculose geene algemeene bloedontlastingen.

XIII.

Knoopen in de navelstreng verhinderen de circulatie niet.

XIV.

Bij uitzakking van de navelstreng is de hand het beste middel om te reponeren.

XV.

De bestendige uitrekking bij schuinsche beenbreuken met het doel, om alle verkorting te voorkomen, geeft nageneg geen uitkomsten.
