

University of Groningen

Vastheid en elasticiteit van den tienden borstwervel van den mensch

Havinga, Lambertus Roelof Wouter

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1921

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Havinga, L. R. W. (1921). *Vastheid en elasticiteit van den tienden borstwervel van den mensch*. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Stellingen.

1. De directe aanleiding voor het ontstaan van een gefixeerde kyphose resp. kyphoscoliose bij jonge rachitische kinderen is — vaker dan men wel denkt — een fractuur van een of meer wervels.
 2. De veronderstelling dat een posttraumatische kyphose (ziekte van Kümmell) kan ontstaan uitsluitend door een verhoogde plasticiteit van de betreffende wervels is onjuist.
 3. De mechanische theorie over het ontstaan van de zoogenaamde trechterborst verklaart deze afwijking slechts ten deele.
 4. De domesticatie is niet de voornaamste oorzaak van de rachitis.
 5. De Obstetrische Paralyse is een gevolg van een scheur in den Plexus Brachialis. Het standpunt van F. Lange die meent hier in hoofdzaak te doen te hebben met de gevolgen van een distorsie in het schoudergewricht, is onhoudbaar.
 6. Het is niet waarschijnlijk dat de dichter Heinrich Heine aan Tabes Dorsalis heeft geleden.
 7. De symphysiotomie verdient de voorkeur boven de pubeotomie.
 8. Het is wenschelijk dat in de laatste maanden der graviditeit geregeld de bloedsdruk wordt bepaald.
 9. Het is zeer twijfelachtig of er een echte traumatische diabetes bestaat.
 10. Het vinden van een ureum gehalte in het bloed van meer dan één gram per liter behoeft niet steeds een ernstige beteekenis te hebben.
 11. Er bestaat eene Ophthalmia Phacogenetica.
 12. By het blijven bestaan van een zelfstandig Os Acromiale is het juist de verbinding hiervan met de Spina Scapulae niet Acromio-spinaalgewricht te noemen. De naam intraacromiaalgewricht is in zoo'n geval beter.
 13. De woningontsmetting na diphtheritis kan als overbodig worden beschouwd.
 14. Bij de radioëpilatie van het hoofd verdient het gebruik van een (desnoods zwak) aluminiumfilter aanbeveling.
 15. Het aanwezig zyn van bloed in tuberkels van de milt is een gevolg van den anatomischen bouw van dit orgaan.
-