

University of Groningen

## Over de röntgentherapie der genitaaltuberculose van den man

Goettsch, Hendrik Balthasar

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*  
1935

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Goettsch, H. B. (1935). *Over de röntgentherapie der genitaaltuberculose van den man*. s.n.

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN.

### I

De genitaaltuberculose behandelde men conservatief; slechts bij uitzondering worde radicaal-chirurgische behandeling toegepast.

### II

Bij de geprotraheerd-gefractioneerde röntgenbestraling van maligne tumoren worde de r/min.-dosis bepaald door de radiosensibiliteit van den te bestralen tumor.

### III

Bij röntgenrefractaire gevallen van actinomycosis beproeve men een behandeling met „Fuadin”.

### IV

Aan het wervellichaam van den mensch worden tijdens de groei-periode geen „epiphysen” aangetroffen.

### V

Men ruime aan de röntgenbehandeling een plaats in onder de behandelingsmethoden der tuberculeuse oogaandoeningen.

### VI

De myelographie reserveere men uitsluitend voor die gevallen, in welke een partiëel of totaal blok verwacht wordt.

## VII

Bij lijders aan een chronische insufficiëntie van het hart overwegen een totale exstirpatie van de schildklier.

## VIII

De op jeugdigen leeftijd aangetroffen bronchiëctasieën zijn meestal van congenitalen oorsprong.

## IX

De frequentie van de langs röntgenographischen weg aangetoonde congenitale afwijkingen in de wervelkolom, met name de spina bifida occulta van L V en S I, is van dien aard, dat voor de kliniek deze bevindingen slechts geringe waarde bezitten.

## X

Het sarcoid van BOECK moet beschouwd worden als een aandoening met een tuberculeuse aetiologie.

## XI

Steriliteit kan berusten op een hypofunctie van de schildklier.